

Jagttagelser over Veirforholdene

paa Landbohøjskolen og Landhuusholdningssekskabets Stationer i Marts og April Maaneder.

Marts 1861.

	Middelvarme (G°)	Varmeste Dag		Kuldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhæbe i Linier	Regn- og Sne- dagens Antal	Middel-Vugtig- hedsgrad i Gr. 2 i 100.
		Dag	Varme	Dag	Varme				
Landbohøjskolen	2,8	31te	9,0	14de	÷4,3	27" 8,93	28,4	19	85
Hindholm ved Røstved . . .	3,2	31te	10,7	14de	÷3,0		31,6	20	77
Næsgaard ved Stubbejøbing	2,8	24de	8,6	14de	÷3,2	27" 9,13	29,6	19	85
Smidstrup ved Hjørring . .	2,1	29de	7,7	14de	÷2,7		21,8	15	92
Larm ved Varde	3,1	31te	10,4	14de	÷3,0		22,3	21	88
Skaarupgaard ved Aarhus	2,5	31te	7,9	14de	÷3,8	27" 9,81	22,8	21	82
Maiholgaard ved Sønderborg .	3,7	31te	9,5	14de	÷0,3		29,1	16	mangler.

Paa Landbohøjskolen havde den laveste Varmegrad den 14de med $\div 7,0^{\circ}$, paa Hindholm samme Dag med $\div 5,6$ og paa Skaarupgaard den 13de med $\div 7,6^{\circ}$ C.

Paa Landbohøjskolen har Varmen i 8 Døgn været under Frysepunktet, paa Hindholm i 6 og paa Skaarupgaard i 12.

Lufstrykket har i Marts Maaned gennemgaaende været temmelig lavt; enkelte Dage endog ualmindelig lavt, som f. Ex. den 11te og 21de, da det kun var 1 til 2 Linier over 27 Tommer.

Et meget stærkt Nordlys den 9de om Aftenen Kl. 9—11 blev iagttaget paa forskjellige Stationer, — baade ved Vesterhavet og paa Sjælland.

Der er ofte falden Regn, men ikke i nogen betydelig Mængde. Det største Regnfald var 6,5 Linier paa Næsgaard den 3die.

April 1861.

	Middelbarne (Go)	Varmeste Dag		Koldeste Dag		Luftens Middel- tryk	Regnhøide i Linier	Regn- og Sne- bagenes Antal	Middel-Regn- høide i Linier
		Dag	Varde	Dag	Varde				
Landbohøjskolen	4,6	12te	8,9	19de	2,3	28" 1,19	5,8	6	66
Hindholm . . .	5,2	12te	9,1	19de	2,7		13,3	11	67
Næsgaard . . .	4,4	12te	8,3	29de	1,9	28" 1,27	19,3	7	73
Smidstrup . . .	5,0	14de	8,4	19de	1,5		8,3	4	71
Larm	5,2	3die	10,0	19de	2,0		9,0	15	75
Skaarupgaard .	4,4	1ste	9,3	26de	1,3	28" 2,43	11,7	9	67
Maiholgaard .	5,4	3die	9,4	28de	3,1		7,0	9	mangler.

Paa Landbohøjskolen havde den laveste Varmegrad den 20de med $\div 4,0^{\circ}$ C, paa Hindholm den 29de med $\div 4,5$ og paa Skaarupgaard ligeledes den 29de med $\div 5,0^{\circ}$ C.

Paa Landbohøjskolen var Varmen i 12 Døgn under Frysepunktet, paa Hindholm i 14 og paa Skaarupgaard i 10 Døgn.

Regnmængden har i April Maaned været lav, og af stærkere Regnfald har der kun været et, nemlig paa Næsgaard, den 5te, hvor der faldt 8 Linier Regn.

Lufstrykket har i Modjætning til Marts Maaned været temmelig høit, — den 9de endog over 28" 8'''.

Den 25de begyndte paa de fleste Stationer en stærk Blæst fra Vest, der den 26de gik over til Storm, medens den dreiede sig til NB.

De nordlige og vestlige Vinde have været stærkt fremherskende i April. Vindens Retning iagttages 3 Gange daglig og har paa Landbohøiskolen været 47, paa Hindholm 52, Næsgaard 50, Smidstrup 70, Larm 48, Skaarupgaard 51 og paa Maibølgaard 51 Gange i Vest eller Nord eller derimellem.

Anm. Maanedens Middelvarme er ved Landbohøiskolen bestemt ligefrem som Middeltal af Jagttagelser Kl. 7, 12 og 11; sammesteds iagttages desuden Kl. 8, 2 og 10, og Forskjellen mellem begge de derved erholdte Resultater benyttes som Rettelse for de andre Stationer, hvor der (med Undtagelse af Hindholm) kun aflæses Kl. 8, 2 og 10. Varmegraden, der findes anført under varmeste og koldeste Dag, er derimod Middeltallet af Jagttagelserne Kl. 8, 2 og 10 uden Rettelse. Luftens Middeltryk er bestemt ved Jagttagelser Kl. 8, 2 og 10.